

SAUGOK SAVE
IR SAVO ARTIMUOSIUS!

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS
www.ulac.lt
Nugalėtojų g. 14 D, 10105 Vilnius
Tel. (8 5) 230 0125
El. paštas ulac@ulac.lt


U|LAC

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ
IR AIDS CENTRAS



TYMAI





● PLITIMAS

Plinta kosint, čiaudint, per kvėpavimo takų sekretais suterštas rankas ar daiktus.


Virusas yra ypač lakus, plinta oro srautais pastato ribose: koridoriais, laiptinėmis, ventiliacijos kanalais ir pan.

Virusas jautrus ultravioletiniams saulės spinduliams, cheminėms medžiagoms, todėl ant įvairių paviršių išlieka gyvybingas iki 2 valandų.

● INKUBACINIS LAIKOTARPIS


Trunka 10-12 dienų, rečiau – 19-21 dieną.

Infekuotas asmuo 4 dienas iki pirmųjų ligos požymių ir pirmas 4-7 ligos dienas tymų virusą išskiria į aplinką.



TYMAI

TAI ŪMI, YPAČ UŽKREČIAMA
VIRUSINĖ INFEKCIJA,
PAVOJINGA IR VAIKAMS,
IR SUAUGUSIESIEMS.
SUSERGA IKI 95% NESIRGUSIŲ
AR NESKIEPYTŲ, KONTAKTAVUSIŲ
SU SERGANČIAISIAIS TYMAIS,
ASMENŲ.



● SIMPTOMAI IR KOMPLIKACIJOS

Karščiavimas, kosulys, sloga, akių junginių uždegimas.

Po 1-2 dienų atsiranda bėrimas. Pirmiausia – galvos srityje, vėliau – ant liemens, galūnių. Bėrimui nykstant, jo vietoje kurį laiką išlieka rusva pigmentacija.

Komplikacijos: plaučių, gerklų, ausų uždegimai. Galimas smegenų uždegimas.

● PROFILAKTIKA

Veiksmingiausia profilaktikos priemonė – skiepai. Lietuvoje nuo tymų pradėta skiepyti 1964 m. Pagal vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių skiepijami 15,5 - 16 mėn. ir 6 - 7 metų vaikai.

Įskiepijus dvi tymų vakcinos dozes, pasiekama patikima ilgalaikė apsauga.

Skiepai nuo tymų išvengti ligos padeda ir tuomet, jeigu po kontakto su sergančiuoju praėjo ne daugiau nei trys paros.